Études

EN SIMPLE

Le **Burn Out Autistique**, sources et expressions.

thérapie Autisme.

auto THÉRAPIE

Auteur·rices :

Dora Raymaker, chercheuse autiste, professeure à Portland State University, accompagnée de clinicien·nes et chercheur·ses neurotypiques. Étude co-construite avec des adultes autistes dans une logique participative.

Référence : Raymaker, D. M., Teo, A. R., Steckler, N. A., Lentz, B., Scharer, M., Delos Santos, A., ... & Nicolaidis, C. (2020). "Having All of Your Internal Resources Exhausted Beyond Measure and Being Left with No Clean-Up Crew": Defining Autistic Burnout. Autism in Adulthood, 2(2), 132–143.

Lue et synthétisée pour vous par Florence DEMOURANT NEF

Mon Opinion

Ce que je salue avant tout dans cette étude, c'est sa démarche profondément **co-constructive**. On n'est pas face à une énième **enquête "sur" les autistes,** mais à un travail mené **avec eux, par eux, pour eux.** Le choix **méthodologique** d'une approche qualitative n'est pas anodin : il permet de privilégier le **narratif**, la **nuance**, l'expérience incarnée, là où les chiffres, s'ils sont utiles, échouent souvent à capturer la texture du vécu.

Cette étude parle de burn-out comme les patient·es me le décrivent en cabinet : non pas une **pathologie abstraite**, mais une **déconnexion douloureuse** d'avec ses propres fonctions, vécue dans la **solitude**, souvent sans mots pour la nommer. Ce que Raymaker et son équipe parviennent à faire ici, c'est mettre une **forme scientifique** à un vécu profondément sensoriel, cognitif, existentiel.

Je salue également le **respect du fond :** aucun terme maladroit, aucune tentative de **simplification** ou de **pathologisation** forcée. Les **citations** sont là, brutes, exactes, souvent bouleversantes — et elles résonnent avec une **justesse clinique rare**. L'étude n'a pas pour but d'étiqueter, mais de rendre visible, de légitimer, de restituer une réalité vécue comme illisible par les systèmes de santé classiques.

Autrement dit : tout y est.

La rigueur. La forme. Le fond. Et surtout : la vérité du vécu.

Florence

Objectif & méthodologie de l'étude

L'objectif de cette étude était de poser une définition claire, partagée et incarnée du burn-out autistique, en partant non pas d'une grille psychiatrique, mais du vécu direct des personnes concernées. Pour cela, les auteur·rices ont utilisé une méthodologie qualitative rigoureuse (Grounded Theory), à partir d'entretiens approfondis menés auprès de 19 adultes autistes (avec ou sans diagnostic formel), tous ayant traversé un ou plusieurs épisodes de burn-out. L'analyse s'est appuyée sur une démarche inductive : ce sont les témoignages eux-mêmes qui ont fait émerger les catégories-clés, et non un modèle préétabli. L'étude adopte une approche participative forte : plusieurs chercheur·ses sont autistes, et les participant·es sont considérés comme co-producteurs de savoir — pas comme objets d'étude.

Ce que l'étude montre

L'étude met en lumière un syndrome fonctionnel distinct, vécu par toutes les personnes interrogées comme une rupture brutale dans leur capacité à fonctionner, mais non reconnu dans les classifications médicales. Ce que ces personnes décrivent, c'est un état de saturation systémique, progressif puis irréversible, dans lequel les ressources internes (cognitives, émotionnelles, sensorielles, sociales) sont épuisées au point de ne plus être accessibles. L'effondrement n'est pas seulement subjectif : il se manifeste par une perte réelle et observable de compétences acquises, parfois temporaire (langage, organisation, relations), parfois plus durable.
Trois dimensions centrales émergent de manière convergente dans tous les témoignages :

Une fatigue multidimensionnelle : décrite comme « plus que de l'épuisement », « une perte de substance », « une vidange complète du système ». « Ce n'est pas juste être fatigué, c'est comme si mes fonctions vitales tournaient en économie d'énergie. »

« J'ai arrêté de pouvoir parler aux gens. Même répondre à un texto devenait impossible. »

Une perte de capacités adaptatives : les participant·es décrivent une incapacité soudaine à "faire semblant", à maintenir des stratégies de camouflage, à gérer des tâches basiques. « J'ai arrêté de pouvoir parler aux gens. Même répondre à un texto devenait impossible. » **Un dérèglement sensoriel et émotionnel profond :** là où une lumière, un bruit, une interaction étaient "gérables" auparavant, tout devient insupportable, et le monde social devient source de danger immédiat.
« Je n'étais pas triste. J'étais surexposée. Tout me faisait mal. »

L'étude insiste sur le fait que ces manifestations ne sont ni **transitoires**, ni **subjectives**, mais objectivement invalidantes. Elles s'accompagnent d'une lucidité douloureuse : « J'étais parfaitement consciente de ce que je voulais faire. Mais je n'y avais plus accès. Mon corps, ma tête, mes mots, rien ne répondait. »
Enfin, un point crucial ressort : ce n'est pas l'émotion qui lâche, c'est le système. Les personnes interrogées ne parlent pas d'abattement dépressif, mais de disjonction fonctionnelle, de saturation biologique. Elles savent ce qu'elles veulent, mais plus rien n'obéit. Et cette distinction est fondamentale : « Ce n'était pas "je ne veux plus vivre". C'était "je n'ai plus les circuits pour continuer à vivre comme ça". »

Une différenciation franche avec la dépression

L’un des apports majeurs de cette étude est de clarifier la confusion fréquente entre burn-out autistique et dépression. Car si les deux états peuvent partager des signes superficiels (fatigue, retrait social, baisse de motivation), leurs logiques internes sont radicalement différentes — et ce sont les personnes concernées qui en témoignent le mieux.

Dans la dépression, il y a souvent perte de désir, perte de valeur personnelle, perte de projection. Dans le burn-out autistique, le désir reste, mais les circuits d’exécution sont saturés ou inaccessibles. « Je voulais lire, écrire, parler, mais je ne pouvais plus. Je n’avais pas perdu l’envie, j’avais perdu l’accès. » Cette nuance est essentielle : le noyau de l’identité, les intérêts spécifiques, la conscience de soi restent présents. Ce qui s’éteint, ce n’est pas l’être, c’est la bande passante. La personne voit clairement ce qu’elle ferait si elle le pouvait — et c’est précisément ce qui rend l’expérience si douloureuse.

Raymaker et ses collègues insistent donc : diagnostiquer à tort une dépression chez une personne autiste en burn-out, c’est non seulement inefficace, mais délétère. Cela peut conduire à des traitements inadaptés (antidépresseurs, psychothérapies de relance) qui aggravent la surcharge au lieu de la réduire. Il ne s’agit pas de "se remotiver", mais de désactiver l’alarme constante du système nerveux.
En cela, l’étude propose un changement de paradigme : le burn-out autistique est un effondrement de type fonctionnel, structurel, systémique — et non une altération de l’humeur. Il requiert une réponse respectueuse du rythme neurobiologique, non une injonction au mieux-être.



des participants à. l'étude qualitative de Raymaker déclarent avoir vécu **au moins** un **burn-out autistique majeur**, souvent **non reconnu** par les professionnels.



La moitié ont vécu une **perte temporaire** de **compétences acquises** (langage, gestion des tâches simples, interactions sociales).

expliquent que le burn-out est **directement** lié au **camouflage** social et à la **pression d'adaptation** constante.





Plus de 80 % décrivent des effets cognitifs durables : pertes de **mémoire**, difficulté de **concentration**, ralentissement, "**brouillard** mental".

100 % des participants décrivent le burn-out autistique comme **distinct de la dépression.** Il s'agit pour eux d'une perte de **capacités** fonctionnelles, pas d'une **perte de désir** ou d'estime de soi.

Conclusion de l'étude.

Cette étude marque une étape décisive dans la reconnaissance du burn-out autistique comme réalité neurologique, fonctionnelle et sociale à part entière. Elle ne se contente pas de recueillir des témoignages : elle construit, à partir d'eux, une théorisation rigoureuse de ce qu'est le BOA — non pas un état d'âme, mais un effondrement structurel provoqué par une accumulation de pressions inadaptées.

Raymaker et ses collègues ne cherchent pas à médicaliser davantage l'autisme, mais au contraire à redonner aux personnes concernées la légitimité de leur vécu, et à poser un cadre explicatif là où il n'y avait jusque-là que du flou, du doute ou du mépris. Leur travail montre qu'une personne autiste peut "fonctionner" extérieurement tout en étant en train de s'effondrer intérieurement, tant qu'aucun espace n'est prévu pour entendre et valider cette usure.

Ce que l'étude propose, en filigrane, c'est une autre forme d'écoute clinique : écouter non pas ce qui est visible, mais ce qui coûte, non pas ce qui manque, mais ce qui déborde. Elle remet aussi en cause une idée centrale dans l'accompagnement du TSA : celle selon laquelle l'adaptation constante est une vertu. Ici, l'adaptation est le terrain du burn-out.

Ce n'est pas le fonctionnement autistique qu'il faut rééduquer.
C'est l'environnement qui doit cesser d'exiger l'impossible.

En donnant une langue à ce vécu partagé, l'étude ouvre enfin la voie à des formes d'accompagnement plus justes, plus respectueuses, plus lucides. Elle ne promet pas une guérison, mais une compréhension. Et parfois, c'est déjà ce qui sauve.